

Deuxième Partie :
constituants de la matière

Unité 5

Pr. HICHAM
MAHAJAR

هندسة بعض الجزيئات


**La géométrie de
quelques molécules**



Tronc Commun
Chimie

Page : $\frac{1}{2}$

- Les **gaz rares** ($He(Z = 2)$, $Ne(Z = 10)$ et $Ar(Z = 18)$...) ne participent quasiment pas à des **réactions chimiques**, ne forment pas de **molécules** ou d'**ions**. Les gaz rares sont **stables** à l'état d'atome isolé car leur couche externe est **saturée**.
- Au cours des transformations chimiques, les éléments chimiques évoluent de manière à avoir la structure électronique de plus proche gaz rare ($He: (K)^2$, $Ne: (K)^2(L)^8$ ou $Ar: (K)^2(L)^8(M)^8$). Ils portent donc (2 ou 8) électrons sur leur couche externe.
- Les ions monoatomiques stables vérifient les règles duet et octet. $Na^+ : (K)^2(L)^8$
- La **molécule (stable et neutre)** est des **assemblages d'atomes** attachés les uns aux autres.
- Une **liaison covalente** est une **liaison chimique** dans laquelle deux atomes se partagent 2 e^- de leurs **couches externes** afin de former un **doublet d'électrons** liant les 2 atomes.
- La **représentation de Lewis** est une **représentation des atomes** et de tous les **doublets d'électrons** (liants et non-liants) : structure électronique - n_t / doublets d'électrons $n_d = \frac{n_t}{2}$ / liaisons covalentes $n_L = (8 \text{ ou } 2) - p$ / doublets non liants $n'_d = \frac{p - n_L}{2}$.
- Types de formules : Formule Brute / Formule semi-développée / Formule développée.
- On appelle **isomères** toute espèce chimique ayant la **même formule brute** mais correspondre **plusieurs formules semi-développées** différentes.
- Les **doublets liants** et **non liants** se repoussent et la **disposition spatiale** d'une molécule est liée à cette répulsion, de façon à ce qu'ils soient **le plus loin possible**.
- La **représentation de Cram** donne un aperçu de la **configuration spatiale** des atomes qui composent une molécule.



Exercice : 1

QCM

Cocher la réponse exacte.

*** Dans une molécule, les atomes sont liés entre eux grâce à des :**

- ☐ électrons libres
- ☐ doublets d'électrons liants
- ☐ doublets d'électrons non-liants

*** Si le doublet d'électrons est partagé entre deux atomes, il forme une :**

- ☐ liaison chimique
- ☐ liaison ionique
- ☐ liaison covalente

*** Si le doublet est porté par un seul atome, il est dit:**

- ☐ électrons de valence
- ☐ doublets d'électrons liants
- ☐ doublets d'électrons non-liants
- * Le nombre global d'électrons d'une molécule est la somme des électrons de la :**
 - ☐ couche saturée
 - ☐ couche interne
 - ☐ couche externe
- * Dans la représentation de Lewis, les liaisons covalentes sont représentées par :**
 - ☐ une flèche
 - ☐ un trait
 - ☐ des points
- * Les gaz rares ne participent quasiment pas à des réactions chimiques car ils sont :**
 - ☐ stables
 - ☐ à l'état gazeux
 - ☐ à l'état atomique

Deuxième Partie :
constituants de la matière

Unité 5

Pr. HICHAM
MAHAJAR

هندسة بعض الجزيئات


La géométrie de
quelques molécules

Tronc Commun
Chimie

Page : $\frac{3}{3}$

Exercice : 8

- 1- Définir les **isomères**.
- 2- Donner toutes les **formules semi-développée** pour les isomères de la molécule C_3H_8O .
- 3- Donner la **formule semi-développée** de tous isomères des molécules suivantes : CH_4 , C_5H_{12} et C_4H_9OH .
- 4- On considère les 2 molécules ci-dessous :



- 4-1- Donner la **formule brute** des molécules.
- 4-2- Est-ce qu'il existe d'autres **molécules** ayant la **même formule brute** ?

Exercice : 9

La molécule de **difluor** a pour formule F_2 .

- 1- Déterminer le **nombre d'électrons de la couche externe** d'un atome de **Fluor** ($Z = 9$).
- 2- Calculer le **nombre d'électrons** apportés par l'ensemble des **couches externes** des deux atomes de la molécule de **difluor**. En déduire le **nombre de doublets** de la molécule.
- 3- Donner la **représentation de Lewis** de la molécule de **difluor**.

Exercice : 10

La molécule de **trichlorure de phosphore** a pour formule PCl_3 .

- 1- Donner la **structure électronique** d'un atome de **phosphore** ($Z = 15$) et celle d'un atome de **chlore** ($Z = 17$). En déduire le **nombre d'électrons de la couche externe** des atomes de **phosphore** et de **chlore**.


- 2- Calculer le **nombre d'électrons** apportés par l'ensemble des **couches externes** des atomes de la molécule. En déduire le **nombre de doublets** de la molécule.
- 3- Donner la **représentation de Lewis** de la molécule. Déterminer les **nombre de doublets liants** et de **doublets non-liants**.

Exercice : 11

On étudier la molécule qui constitué d'atome de **silicium** $_{14}Si$ et quatre atomes de **carbone** $_6C$ et des atomes d'**hydrogène** $_1H$.

- 1- Déterminer le **nombre de liaisons covalentes** pour les atomes de **silicium** et de **carbone** pour vérifier la **règle d'octet**.
- 2- L'atome d'**hydrogène** est **monovalent**. Quelle règle vérifier l'**hydrogène** ?

- 3- Compléter la **formule développée** suivante avec le nombre d'atomes d'**hydrogène** nécessaires, puis donner la **formule brute**.



- 4- Déterminer n_1 **nombre de doublets liants** et n_2 **nombre de doublets non-liants** dans cette molécule.
- 5- Donner la **formule semi-développée** de cette molécule, puis donner la **représentation de Cram** et de la **forme géométrique** de cette molécule dans l'espace.
- 6- Ecrire les **formules semi-développées** de tous isomères de cette molécule.